

چه کسی به سرطان گردن رحم مبتلا می شود؟

این سرطان در اغلب موارد در خانم های بین ۲۵ تا ۴۵ سال اتفاق می افتد. در بعضی موارد در افراد مسن تر و یا جوان تر ایجاد می شود. ابتلا در زیر ۲۵ سال نادر می باشد. سرطان گردن رحم توسط تست های منظم غربالگری قابل پیشگیری و قابل تشخیص و درمان در مراحل اولیه پیش سرطانی می باشد.

مهمترین عوامل خطر سرطان گردن رحم:

- رفتارهای جنسی پرخطر بیمار یا شریک جنسی
- شروع فعالیت جنسی در سن پایین
- سیگار: در سیگاری ها احتمال بروز سرطان سرویکس ۲ برابر بیشتر از غیر سیگاری ها می باشد. به ویژه اگر کسی سیگار می کشد و عفونت HPV دارد خطر بالاتر است.
- سیستم ایمنی ضعیف: به عنوان مثال افراد با ایدز افرادی که داروهای سرکوبگر ایمنی استفاده می کنند، خطر بالایی دارد.

افراد مبتلا به ایدز یا افرادی که داروهای سرکوبگر ایمنی استفاده می کنند خطر بالاتری دارند. اگر اگر کارکرد سیستم ایمنی کامل نباشد بدن قادر به برخورد با عفونت HPV و سلول های غیرطبیعی نخواهد و خطر سرطان دهانه رحم وجود دارد.

علائم سرطان دهانه رحم : در مراحل اولیه معمولاً هیچ علامتی وجود ندارد. علائم عبارتند از:

۱. خونریزی رحمی بین قاعدگی های نرمال
۲. خونریزی بعد از مقاربت
۳. هر نوع خونریزی رحمی در زنان بعد از یائسگی، ترشح با بوی ناخوشایند
۴. ناراحتی یا درد حین مقاربت

تشخیص: پزشک معمولاً یک معاینه داخلی انجام می دهد. در معاینه ممکن است گردن رحم بزرگ یا غیرطبیعی احساس شود و چنانچه در معاینه یا تست سرطان (پاپ اسمیر) شکی به سرطان گردن رحم وجود داشته باشد کولپوسکوپی انجام می شود.

کولپوسکوپی:

کولپوسکوپی روش دقیق تری جهت ارزیابی گردن رحم است. در این روش گردن رحم با بزرگنمایی و با جزئیات بیشتر دیده شود. تست حدود ۱۵ دقیقه طول می کشد. در طی کولپوسکوپی معمولاً یک قسمت کوچک از بافت دهانه رحم (نمونه) برداشته می شود و سپس نمونه زیر میکروسکوپ برای سلولهای سرطانی آزمایش می شود. برای ارزیابی میزان گسترش سرطان سرویکس یا مرحله بندی تست های بیشتری درخواست می شود. مثلاً سی تی اسکن، MRI، عکس قفسه سینه، سونوگرافی و آزمایشات خونی. تعیین مرحله سرطان به پزشکان کمک می کند تا بهترین گزینه های درمان را توصیه کنند.


درمان سرطان گردن رحم: جراحی، رادیوتراپی، ترکیب شیمی درمانی و رادیوتراپی یا شیمی درمانی تنها. درمان بستگی به عوامل مختلفی از قبیل مرحله سرطان (اندازه تومور اولیه) و میزان گسترش آن دارد.

جراحی: می تواند به صورت برداشتن رحم یا گردن رحم با یا بدون برداشتن غدد لنفاوی باشد. اگر سرطان در مراحل اولیه باشد و گسترش به



سرطان گردن رحم (سرویکس)

دکتر لیلا پیرزاده
دکتر طاهره اشرف گنجویی



فروردین ۱۳۹۸

سرطان
گردن رحم



پیش آگهی:

بهترین پیش‌آگهی سرطان گردن رحم در کسانی است که ضایعه زود تشخیص داده شود و محدود به گردن رحم بوده و گسترش نداشته باشد.

پیام ۱: امکان پیشگیری از سرطان گردن رحم با انجام منظم پاپ اسمیر و معاینات منظم وجود دارد.

پیام ۲: در صورت هر نوع خونریزی وسط قاعدگی ها، پس از نزدیکی یا ترشحات خونی و بد بو مراجعه به پزشک معالج ضروری است.

مناطق دیگر نداشته است جراحی به تنهایی می‌تواند جنبه درمانی داشته باشد. در بعضی موارد، اگر سرطان در مراحل خیلی اولیه باشد ممکن است برداشتن گردن رحم به تنهایی کافی باشد (بدون اینکه کل رحم برداشته شود) و این مسئله باعث حفظ باروری فرد می‌شود.

رادیوتراپی: رادیوتراپی نوعی درمان است که پرتوهای پرنانرژی رادیاسیون (تابش) روی بافت سرطانی متمرکز شده سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد یا باعث توقف رشد آنها می‌شود. رادیوتراپی به تنهایی می‌تواند درمانی برای مراحل اولیه سرطان دهانه رحم باشد و یا ممکن است جایگزینی برای جراحی باشد. دو نوع رادیوتراپی خارجی و داخلی برای سرطان گردن رحم کاربرد دارد.

شیمی درمانی: نوعی درمان با داروهای ضد سرطان، سلول‌های سرطانی را از بین می‌برند یا رشد آنها را متوقف می‌کنند. در مواردی هم به عنوان درمان کمکی سرطان گردن رحم استفاده می‌شود.