

سیگار و ضعف سیستم

ایمنی منجر به پیشرفت

عفونت HPV می شود.

سیگار با ایجاد اختلال در عملکرد سیستم ایمنی مانع از پاک شدن عفونت HPV از بدن شده و منجر به پایداری این عفونت می گردد.

عفونت HPV می تواند در انواع کم خطر زگیل تناسلی و در انواع پرخطر، ضایعات پیش سرطانی و سرطان ایجاد کند.

مصرف سیگار و سرطان گردن رحم، دستگاه تناسلی خارجی و مهبل (واژن):

در میان بدخیمی های دستگاه تناسلی سرطان گردن رحم و مهبل (واژن) و نیز بخشی از سرطانهای ناحیه دستگاه تناسلی خارجی ارتباط مستقیم با عفونت HPV دارد. در واقع عفونت HPV عامل لازم و اساسی در ایجاد سرطان مهبل (واژن) و گردن رحم است.

مصرف سیگار با ایجاد

یائسگی زودرس منجر به

پوکی استخوان می شود.

سیگار و سرطان های دستگاه تناسلی زنان :

متأسفانه شیوع مصرف سیگار امروزه در میان زنان در حال افزایش می باشد در حالیکه عوارض بسیاری دارد. از لحاظ سیستم زنانه مصرف سیگار در زنان علاوه بر عوارض نظیر قاعدگی نامنظم و دردناک، یائسگی زودرس و عوارض آن، پیامدهای ناگوار در بارداری، سطح پائین استروژن به دلیل اثرات ضد استروژن سیگار (که باعث علائم روحی و روانی می شود)، سبب ایجاد انواع سرطانها نیز می شود.



سیگار و سرطان های زنان

دکتر حمیده غلامی
دکتر میترا محیط



فروردین ۱۳۹۸

سیگاری خطر سرطان اندومتر
کاهش می یابد.

لازم به ذکر است مصرف سیگار
خطر سرطان ریه و سرطان گوارش
را افزایش می دهد.



پیام: بدن شما امانت خداوند نزد
شماست، امین باشید. همین امروز
سیگار کشیدن خود را
ترک کنید.

زنان سیگاری مبتلا به ضایعات
پیش بدخیم گردن رحم دوبرابر
زنان غیر سیگاری مشابه در
معرض ابتلا به سرطان هستند.

مصرف سیگار و سرطان تخمدان:

مطالعات نشان داده است که سیگار
خطر بعضی از انواع سرطان های
تخمدان را افزایش می دهد.

مصرف سیگار و سرطان آندومتر:

سرطان اندومتر با افزایش استروژن
ارتباط مستقیم دارد لذا با توجه به
اثرات ضد استروژنی سیگار و
کاهش میزان استروژن در زنان