

سرطان آندومتر: آندومتر پوشش داخلی رحم است که در طول سیکل های قاعدگی رشد و سپس ریزش می یابد. سرطان آندومتر از بدخیمی های شایع سیستم زنان می باشد.

عوامل مستعدکننده سرطان آندومتر:

۱. مصرف داروی هورمونی با ترکیبات استروژن
۲. نازایی و عدم بارداری
۳. چاقی به واسطه ساخته شدن استروژن در سلولهای چربی
۴. یائسگی بعد از سن ۵۲ سالگی و شروع زودرس قاعدگی
۵. مصرف داروی تاموکسیفن (که در جهت درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار می گیرد).
۶. ابتلا به دیابت
۷. تخمدان پلی کیستیک
۸. عوامل ژنتیکی

نکته: مصرف قرص های ضدبارداری اثر محافظتی در مقابل سرطان آندومتر دارد.

علائم سرطان آندومتر:

❖ خونریزی غیرطبیعی: هرگونه خونریزی در سنین بعد از یائسگی حتی لکه بینی مختصر، خونریزی بعد از مقاربت، خونریزی غیرطبیعی شدید، نامنظم یا مابین قاعدگی ها در خانمهایی که هنوز یائسه نشده اند.

❖ درد موقع مقاربت یا بعد از آن

❖ ترشحات واژینال

❖ درد در قسمت پایین شکم

در صورت بروز این علائم مشاوره با متخصص زنان لازم است.

روشهای تشخیص سرطان رحم:

۱. سونوگرافی از رحم و تخمدانها: ممکن است از روی شکم و یا از داخل واژن انجام شود.
۲. نمونه برداری از آندومتر: در این روش لوله ای نازک به داخل رحم عبور داده شده و قطعه ای کوچک از آندومتر جهت بررسی پاتولوژی سلولها برداشته

می شود. این روش به طور سرپایی و بدون بیهوشی انجام می شود.

۳. کورتاژ تشخیصی با یا بدون

هیستروسکوپی که به صورت سرپایی یا بستری قابل انجام است.

تشخیص نهایی سرطان آندومتر با بررسی نمونه توسط متخصص پاتولوژی انجام می شود.

تست پاپ اسمیر طبیعی هیچ گاه نمی تواند دلیل بر سلامت قطعی رحم و رد کننده سرطان رحم باشد.






سرطان رحم یا آندومتر

شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان در دنیا

دکتر خدیجه علمی زاده

دکتر طاهره اشرف گنجویی



فروردین ۱۳۹۸

هرگونه تاخیر در مراجعه به پزشک منجر به گسترش بیماری و بالا رفتن مرحله بیماری و در نتیجه کاهش احتمال درمان قطعی می شود.

روش های درمانی:

- * جراحی
- * رادیوتراپی
- * شیمی درمانی
- * هورمون درمانی

پیش آگهی: پیش آگهی بیماری ارتباط مستقیم به مرحله بیماری حین تشخیص دارد. پیش آگهی بیماران در مراحل اولیه بسیار عالی است و بالای ۹۵٪ بیماران بیش از ۵ سال عمر خواهند کرد. تاخیر در مراجعه موجب تاخیر در تشخیص و گسترش مرحله بیماری خواهد شد و طول عمر ۵ ساله کاهش پیدا می کند.

خوشبختانه اکثر موارد سرطان آندومتر در مراحل اولیه با علامت AUB مراجعه می نمایند و در مراحل اولیه تشخیص داده می شوند.

بعد از تشخیص سرطان آندومتر اقدام

بعدی چیست؟

در این مرحله پزشک میزان گسترش بیماری در بدن شما را بررسی می کند. به این کار مرحله بندی می گویند. مرحله بندی بیماری به پزشک این امکان را می دهد که بهترین گزینه درمانی را برای شما انتخاب کند. جهت مرحله بندی ممکن است. اقدامات بیشتری نظیر عکس ریه، سی تی اسکن یا MRI درخواست گردد.

درمان: در صورتی که بیماری کاملاً محدود به رحم باشد یعنی در مرحله ابتدایی قرار گرفته باشد. شانس درمان قطعی بسیار بالاست. با توجه به اینکه در مراحل اولیه خونریزی رحمی غیرطبیعی ایجاد می شود. خونریزی یک علامت هشدار دهنده برای بیمار است. در صورت مراجعه بیمار، معمولاً بیماری در مراحل اولیه و قابل درمان تشخیص داده می شود.