



بولتن خبری

(خبر اول)

اخبار منتشر شده از دهمین کنگره بین المللی سرطان زنان

بریده جراید و آلبوم انتشار اخبار به مورخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین سرطان شایع در میان زنان /

تاثیر قابل توجه غربالگری در کاهش

سرطان های زنان

دومین کنگره بین المللی
انجمن علمی سرطان های زنان ایران
10th International Congress of IRSGO
۳، ۴، ۵ اسفند ۱۴۰۱
تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

دارای ۱۵ امتیاز بازآموزی
گروه هدف


- فلوشیپ انکولوژی زنان
- متخصص زنان
- فوق تخصص خون و سرطان بالغین
- متخصصین پاتولوژی
- متخصصین رادیوانکولوژی
- متخصصین رادیولوژی
- متخصصین عفونی
- متخصصین پوست
- پزشکان عمومی

با برگزاری کارگاه های جانبی
www.irsgo.org/congress2022

Iranian Society of Gynecology Oncology
22, 23, 24
February
2023
Tehran-Iran

دسترسی سریع به بخش‌های مختلف بولتن خبری

با کلیک بر روی هر یک از گزینه‌ها به بخش مورد نظر وارد شوید

متن خبر
آلبوم خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ۳۰ مورد
آلبوم روزنامه ۱ مورد
آلبوم فضای مجازی ۲ مورد
آلبوم عکس خبری
پیکان بازگشت 

تمامی صفحات بولتن، دارای **بک لینک** برای اتصال و ورود به منبع اصلی درج خبر می‌باشند.

اجراء ؛ شرکت ایده پردازان خبر ماندگار (ایپکام)

رئیس انجمن سرطان های زنان ایران مطرح کرد :

دومین سرطان شایع در میان زنان چیست

تأثیر قابل توجه غربالگری در کاهش سرطان های زنان

رئیس انجمن سرطان های زنان ایران با تأکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است .

به گزارش انجمن سرطان های زنان ایران، طاهره اشرف گنجویی رئیس انجمن سرطان های زنان ایران با اشاره به برگزاری دهمین کنگره بین المللی سرطان های زنان در روزهای ۳ الی ۵ اسفند در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، اظهار کرد: در این کنگره در رابطه با آخرین پیشرفت های علمی مرتبط با سرطانهای زنان بحث خواهد شد و اهداف اصلی آن شامل پیشگیری، درمان و همچنین بهبود کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان زنان است.

رئیس انجمن سرطان های زنان ایران با تأکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: موضوع غربالگری عمدتاً در مورد سرطان دهانه رحم مطرح است، که در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.

وی ادامه داد: سرطان دهانه رحم، نه تنها شایعترین و مهمترین سرطان در زنان بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، بلکه به دلیل جوان بودن این افراد هنگام مرگ، اهمیت اجتماعی این بیماری برجسته تر میشود.

گنجویی در مورد اصلی ترین عوامل موثر در ابتلا به سرطان دهانه رحم، بیان کرد: مهمترین عوامل مستعد کننده این بیماری مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پر خطر است. البته این سرطان به دلیل داشتن یک دوره طولانی قبل از تهاجم، در صورت وجود برنامه غربالگری و همچنین وجود درمان مناسب برای ضایعات اولیه، قابل پیشگیری است.

رئیس انجمن سرطان های زنان ایران افزود: برنامه سازمان یافته غربالگری برای زنان ایرانی میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش این بیماری داشته باشد و به عنوان یک ضرورت مطرح است، اما در مورد سرطان جسم رحم غربالگری توصیه نمیشود زیرا در اکثر موارد به صورت خونریزی غیر طبیعی رحمی تظاهر میکند و بنابراین بیمار معمولاً در مراحل اولیه بیماری به پزشک مراجعه میکند.

وی مهمترین عوامل در پیشگیری از سرطان رحم را اینگونه برشمرد و گفت: تغییر سبک زندگی در جهت کاهش اضافه وزن و انجام ورزش میتواند در کاهش میزان سرطان جسم رحم و تخمدان کاملاً مؤثر باشد.



آلبوم انتشار اخبار دهمین کنگره بین‌المللی سرطان‌های زنان از دکتر طاهره


اشرف گنجویی در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری .

امروز ۱۰:۳۷
[ایرنا]

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران تاکید کرد:

ضرورت تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان

تهران - ایرنا - رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران گفت: سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان بوده و اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران ضروری است.



امروز ۱۰:۰۶
[خبرآنلاین]

دو سرطان شایع میان زنان / روش‌های پیشگیری کدامند؟

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با تاکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.



امروز ۱۱:۳۱
[تسنیم]

۲ عامل مؤثر در بروز سرطان "دهانه رحم"

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با بیان اینکه مهم‌ترین عوامل مستعدکننده ابتلا به سرطان "دهانه رحم"، مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر است؛ گفت: این نوع سرطان در صورت وجود برنامه غربالگری، قابل پیشگیری است.



امروز ۱۰:۰۸
[میزان]

دومین سرطان شایع در میان زنان/ تأثیر قابل توجه غربالگری در کاهش سرطان‌های زنان


رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با تاکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.



امروز ۰۹:۴۴
[ایرنا]

دومین سرطان شایع در میان زنان چیست؟/ تأثیر قابل توجه غربالگری در کاهش سرطان‌های زنان

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با تاکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.



امروز ۱۲:۱۵
[تابناک]

دو سرطان شایع میان زنان

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با تاکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.



امروز ۱۰:۵۵
[اقتاب]


دو سرطان شایع میان زنان / روش‌های پیشگیری کدامند؟



رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با تاکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.

امروز ۱۰:۴۳
[فرارو]

دو سرطان شایع میان زنان



رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با تاکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.

امروز ۱۳:۱۷
[همشهری آنلاین]

۲ عامل ابتلا به شایع‌ترین سرطان زنانه | مهمترین راه کاهش این نوع سرطان چیست؟



رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران تشریح کرد:
در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب می‌شود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.


امروز ۱۲:۱۷
[بوترین‌ها]

۲ عامل مؤثر در بروز سرطان در زنان

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با بیان اینکه مهمترین عوامل مستعدکننده ابتلا به سرطان "دهانه رحم"، مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر است؛ گفت: این نوع سرطان در صورت وجود برنامه غربالگری، قابل پیشگیری است.

امروز ۱۲:۲۹
[پارسینه]

دو اشتباهی که منجر به ابتلا زنان به سرطان می شود



رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران دو عامل مؤثر مستعدکننده زنان به سرطان را برشمرد.

امروز ۱۲:۰۵
[اکنونوز]

۲ عامل مؤثر در بروز سرطان "دهانه رحم"

اقتصاد ایران: رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با بیان اینکه مهمترین عوامل مستعدکننده ابتلا به سرطان "دهانه رحم"، مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر است؛ گفت: این نوع سرطان در صورت وجود برنامه غربالگری، قابل پیشگیری است.

امروز ۱۰:۳۶
[بهار]


دوسرطان شایع میان زنان را بشناسید



امروز ۱۴:۱۹
[صدا و سیما]

سرطان دهانه رحم دومین علت مرگ و میر زنان

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران تاکید کرد.



امروز ۱۴:۲۴
[قدس آنلاین]

دو سرطان شایع میان زنان / روش‌های پیشگیری کدامند؟

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با تاکید بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها به خصوص در جامعه زنان ایران، گفت: در بین زنان کشورهای در حال توسعه، سرطان دهانه رحم از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب میشود و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است.



امروز ۱۴:۳۰
[روزنوا]

۲ عامل مؤثر در بروز سرطان "دهانه رحم"

تسنیم

: سرطان دهانه رحم، نه تنها شایع‌ترین و مهم‌ترین سرطان در زنان بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، بلکه به دلیل جوان بودن این افراد هنگام مرگ، اهمیت اجتماعی این بیماری برجسته‌تر می‌شود.

دیروز ۱۴:۳۰
[آریا]

سرطان دهانه رحم دومین علت مرگ و میر زنان



دیروز ۱۵:۰۰
[شفا آنلاین]

۲ عامل مؤثر در بروز سرطان زنان را بشناسید

رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با بیان اینکه مهم‌ترین عوامل مستعدکننده ابتلا به سرطان "دهانه رحم"، مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر است؛ گفت: این نوع سرطان در صورت وجود برنامه غربالگری، قابل پیشگیری است.



	
	
<p>با ما سبک زندگی اقتصادی را گسترش دهید.</p> 	
	
<p>خبری - تحلیلی</p> 	<p>پایگاه خبری-سبک زندگی نگارمگ</p> <p>نگار، مجله ای برای زندگی امروز و فردا</p>
	



جغیان برای نخستین بار در میان جوانان و بزرگسالان با افزایش ناهنجاری در طول عمر مواجه شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که سبک زندگی نامناسب و تغذیه ناسالم، عوامل اصلی در کاهش طول عمر هستند. افزایش طول عمر نیازمند رعایت اصول صحیح تغذیه و سبک زندگی است.

این مجله به ارائه اخبار روزانه، تحلیل‌ها، گزارش‌ها و مقالات علمی در زمینه‌های مختلف می‌پردازد. هدف ما آگاهی‌بخشی و کمک به توسعه کشور است.

آمایش دو گیتی تصویرین دو طرف است

هر ۴۵ دقیقه یک زن به سرطان سینه مبتلا می‌شود



تخمین نسیب بیندازد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی، سرطان سینه به شایع‌ترین سرطان در جهان تبدیل خواهد شد. این افزایش شایعه سرطان سینه در جهان، به دلیل تغییرات سبک زندگی، افزایش سن، و کم‌تحرکی است. متخصصان هشدار می‌دهند که تشخیص زودهنگام و درمان به‌موقع می‌تواند شانس بهبودی را افزایش دهد.

فاجعه پشت چترهای میدان نقش جهان



اعراض بجز نوار خورشیدی و سایر علائم دیده شده در چترهای میدان نقش جهان، نشانگر آلودگی هوا و تغییرات اقلیم است. کارشناسان محیط زیست خواهان جدی‌تر شدن مسئولان در راستای کاهش آلودگی و محافظت از میراث جهانی هستند.

بوترین پوزر شکار جهان عرب در ۲۰۲۳



شرف حائسی مدیر عامل پوزر شکار جهان عرب است که با تلاش بی‌وقفه توانسته به رکورد جهانی دست یابد. این موفقیت حاصل تلاش تیم و حمایت طرفین است.

تیم پزشکی از ۱۱۰ زمین لرزه در دی ماه



تیم پزشکی از ۱۱۰ زمین لرزه در دی ماه در استان کرمان به وقوع پیوسته است. همکاران ما در این منطقه با زهوشان و نجات‌بخشی‌ها در حال نجات جانهای آسیب‌دیده هستند.

منبع مصرف نیکوتین در ایران



مصرف نیکوتین در ایران عمدتاً از طریق دخانیات و تنباکو انجام می‌شود. این موضوع یکی از عوامل خطرناک برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.



۲ عامل ابتلا به سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم در بین زنان کشورهای در حال توسعه، از علل مهم مرگ و میر زنان محسوب می‌شود. و بعد از سرطان سینه، دارای بیشترین فراوانی است. دکتر پاهره اشرف گنجویی، رئیس انجمن سرطان‌های زنان ایران با بیان این مطلب بر اهمیت غربالگری و تشخیص زودرس سرطان‌ها تأکید کرد و گفت: سرطان دهانه رحم، نه تنها شایع‌ترین و مهم‌ترین سرطان در زنان بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، بلکه به دلیل جوان بودن این افراد هنگام مرگ، اهمیت اجتماعی این بیماری برجسته‌تر می‌شود. وی در مورد اصلی‌ترین عوامل مؤثر در ابتلا به سرطان دهانه رحم، بیان کرد: مهم‌ترین عوامل مستعد کننده این بیماری مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر است. البته این سرطان به دلیل داشتن یک دوره طولانی قبل از تهاجم، در صورت وجود برنامه غربالگری و همچنین وجود درمان مناسب برای ضایعات اولیه، قابل پیشگیری است. او مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از سرطان عنوان کرد که در کاهش میزان سرطان جسم رحم و تخمدان هم مؤثر خواهد بود.

۲ عامل ابتلا به سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم در ایران یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها است. این سرطان به دلیل عوامل متعددی ایجاد می‌شود، از جمله مصرف سیگار و داشتن رفتارهای جنسی پرخطر. تشخیص زودهنگام و درمان به‌موقع می‌تواند شانس بهبودی را افزایش دهد.

تبریک سال نو جشنی از نیشا



فرماندار نیشاب در سال نو تبریک عرض کرد و از همه مردم نیشاب برای سال نو مبارک آرزوی خیر کرد. او به اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در این منطقه در سال جدید اشاره کرد.

هوادرتی‌های‌بزرگ‌تر-چندتر-از-جد-تومال



هوادرتی‌های‌بزرگ‌تر-چندتر-از-جد-تومال: به گزارش هواشناسی، در استان نیشاب در روزهای آینده بارش برف قابل توجهی در انتظار است. رانندگان توصیه می‌شود احتیاط کامل داشته باشند و سرعت خود را کاهش دهند.

نشانه‌های کا

نشانه‌های کا: سردردگی، رنگی نسیب، خیریتان قلب و تانسیب سریع، رنگ پوست تغییر، تانگی نسیب.

این بخش شامل گزارش‌های اضافی، مقالات تخصصی و اطلاعیه‌ها است. ما در تلاشیم تا با ارائه محتوای ارزشمند، به توسعه و رفاه جامعه کمک کنیم.

این بخش شامل اطلاعات تماس، آدرس، شماره تلفن و سایر جزئیات مربوط به انتشارات است.

آدرس: ...

تلفن: ...

وبسایت: ...



فضای مجازی – تلگرام



پایگاه خبری گسترش نیوز

Sun

...توصیه جدی درباره این سرطان مرگ آور در زنان رئیس انجمن سرطان های زنان ایران گفت:



خبرگزاری برنا

Sun

...دومین سرطان شایع در میان زنان چیست؟ رئیس انجمن سرطان های زنان ایران: در ب

